카바페넴 항생제는 반드시 약제감수성검사 후 최후 선택 약제로 사용하세요.



카바페넴계 항생제
그람 음성 세균 감염증 최후 치료 약제

카바페넴 내성 장내세균
인체에서 법정 전염병으로 지정

카바페넴 내성균이 의심되는 경우에는

- 카바페넴과 다른 계열의 항생제를 사용합니다.
- 수의사와 보정자는 일회용 가운과 장갑을 사용하거나 진료 후 즉시 환복합니다.
- 해당 반려동물의 배설물 처리 시 장갑 착용하고 처리 후 손을 씻습니다.
- 수의사와 보호자 및 다른 반려동물과 환축의 접촉을 최소화합니다.
- 의료기구를 철저히 소독하고 침습적 시술 시 무균환경을 유지합니다.
- 오염된 진료복은 물론 진료대와 진료실 환경을 살균 소독합니다.

작년 한 해 국내 CRE **감염증 환자**
11,954명
출처 : 보건복지부 감염병 통계, 2018

국내 카바페넴 내성 장내세균으로 인한 **추가 의료비**
594억원
출처 : 질병관리본부 보고서, 2017

카바페넴 내성 장내세균 감염 시 치명률
30-75%
출처 : Tischendorf et.al., 2016

국내 카바페넴 내성균 검출 현황 :
동물병원 내원 개에서 검출(8건,'17~'19)
출처 : Hang JS et.al., 2019
농림축산검역본부 보고서, 2019



농림축산식품부 농림축산검역본부

반려동물 카바페넴 항생제 내성균 검사 관련 문의
임숙경 연구관 (054-912-0738)